

Til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere

Deres ref.:

Vår ref.:
20/15573-140

Dato:
15.12.2021

Informasjonsbrev nr 39 om koronavaksinasjonsprogrammet

Dette brevet inneholder informasjon om:

1. Intervall ned til 4,5 måneder mellom siste dose i primærvaksinasjonsserien og oppfriskningsdose
2. Forventninger til vaksinasjon av gruppen 45 år og eldre og bruk av apotek og Forsvaret
3. Prioritering av ansatte i barnehager og skoler
4. Nasjonal helsepersonellpool
5. Endring i anbefaling om intervall mellom 3.dose i primærvaksinasjonsserien og oppfriskningsdosen for de med alvorlig svekket immunforsvar
6. Tabell med kortversjon av vaksineanbefalingene
7. Influensavaksinasjon - samvaksinering med korona- og influensavaksine

1. Intervall ned til 4,5 måneder mellom siste dose i primærvaksinasjonsserien og oppfriskningsdose

I gjeldende situasjon med økende smitte vurderes det at intervallet mellom siste dose i grunnvaksineringen (for de fleste dose 2) og oppfriskningsdose kan reduseres til 4,5 måneder siden dette vil gjøre at oppfriskningsvaksineringen da kan gjennomføres vesentlig raskere. 4,5 måneder vil tilsvare 20 uker. Reduksjonen i intervall gjelder for de gruppene som per nå er anbefalt oppfriskningsdose. Se mer her: <https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/svar-pa-oppdrag-om-intervall-mellom-siste-dose-i-grunnvaksinering-og-oppfriskningsdose.pdf>

Fordeling av koronavaksiner per kommune er oppdatert med uke 51 og uke 1 og er tilgjengelig her: www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/distribusjon-av-koronavaksiner/vaksinasjon-ved-koronapandemi/

Det blir ingen utsending av koronavaksiner i uke 52.

Vi minner om at koronasertifikatet ikke tar hensyn til anbefalte intervall, dermed vil endringene i anbefalinger ikke påvirke sertifikatene, les mer her: www.fhi.no/om/koronasertifikat/til-helsepersonell-vanlige-problemstillinger-om-koronasertifikat/#intervall-mellom-koronasykdom-og-koronavaksine

2. Forventninger til vaksinasjon av gruppen 45 år og eldre og bruk av apotek og Forsvaret

Regjeringen har nå kommunisert at de har en forventning om at alle 45 år og eldre, *der det er gått 4,5 måneder etter siste dose i grunnvaksineringsen*, skal være tilbudt en oppfriskningsdose innen uke 2 i 2022. En kapasitet på 400 000 doser per uke vil være tilstrekkelig for å nå dette målet, men det forutsetter at det også settes vaksinedoser i uke 52.

Kommunene vil i større grad motta vaksinedoser fra Moderna. For å opprettholde vaksineringsstempoet er det avgjørende at kommunene bruker disse dosene. Det er ikke mulig for kommunene å bestille flere doser Comirnaty (Pfizer) istedenfor Spikevax (Moderna) i de allerede fordelte ukene. Vi er klar over at det er en del som ønsker Comirnaty fremfor Spikevax. Vi minner om at i det er brukt ulike vaksinasjonsregimer i det norske koronavaksinasjonsprogrammet, blant annet kombinasjon av koronavaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer. Bakgrunnen er at det har vært ulik tilgang på vaksinetypene, og samtidig har de to vaksinene vært vurdert som likeverdige og godt egnet for å kombinere. Koronavaksinen fra Moderna eller en kombinasjon av mRNA-vaksinene kan gi et høyere nivå av antistoffer og dermed en mulig økt beskyttelse mot koronasmitte, og kan særlig for den eldre del av befolkningen være fordelaktig.

For å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet i kommunene, også samtidig som det er mange andre tunge oppgaver kommunene står i, jobbes det nå med å forenkle hvordan kommunene kan inngå avtaler med lokale **apotek** for å øke kapasiteten ved oppfriskningsvaksineringsen. Det vil i løpet av kort tid komme mer informasjon om dette som inkluderer standardiserte avtale-maler og informasjon om økonomiske forhold.

Regjeringen har også bedt **Forsvaret** om å bistå kommunene i vaksinasjonsarbeidet. Også her vil det følge mer informasjon om hvordan denne hjelpen vil kunne foregå. Så langt er det kommunisert at bidraget vil bestå i at Forsvaret setter opp team som kan bestå av flere typer helsepersonell, og som kan bistå kommunene etter anmodning fra statsforvalterne.

3. Prioritering av ansatte i barnehager og skoler

Regjeringen har bedt kommunen om å prioritere ansatte i skoler og barnehager for en oppfriskningsdose. Også i denne gruppen skal det gå 4,5 måneder (20 uker) fra siste dose i grunnvaksineringsen til oppfriskningsdosen settes for å gi tilstrekkelige effekt av boostervaksineringsen. Regjeringen har besluttet at dette skal gjelde ansatte i barnehage og skoler over 18 år.

FHI ber kommunene foreta denne prioriteringen så langt det er mulig.

4. Nasjonal helsepersonellpool

Registeret www.nasjonalhelsepersonell.no er fortsatt aktivt og kan brukes ved behov for helsepersonell under pandemien. Helsedirektoratet er i gang med å oppfordre kandidatene til å oppdatere sine profiler, slik at vi får et riktigere bilde av mulighetene i registeret. For mer informasjon om nasjonalhelsepersonell.no, [se her](#)

Det er i tillegg et eget **nasjonalt innsatspersonell til TISK**. Dette innsatspersonellet består av om lag 130 kandidater som er tilgjengelig på kort varsel. Helsepersonellet er intervjuet og kvalitetssikret av et bemanningsselskap, og har gjennomført teoretisk opplæring i testing, smittesporing, vaksineringsen og bruk av smittevernustyr.

Vi vet at det er flere som er tilgjengelig og som kan reise til kommuner som trenger dem. Noen oppgaver, for eksempel smittesporing, kan også løses fra hjemmekontor. Det er opp til den enkelte kandidat om de ønsker/har mulighet til å reise på oppdrag som presenteres for dem.

- E-post: nasjonalthelsepersonell@helsedirektoratet.no
- Telefon: 404 07 998 (08-16 alle virkedager)

5. Endring i anbefaling om intervall mellom 3.dose i primærvaksinasjonsserien og oppfriskningsdosen for de med alvorlig svekket immunforsvar

I en situasjon med økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for at personer i sårbare grupper smittes og blir alvorlig syke, åpnes det nå opp for at ved vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien, kan intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdosen reduseres ned til 3 måneder. Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nr. 4. Se notat – [Justering av intervall for personer med alvorlig svekket immunforsvar](#)

Dosering ved vaksinerings med oppfriskningsdose:

- Comirnaty – Full dose (0,3 ml)
- Spikevax – **Halv** dose (0,25 ml)

6. Tabell med kortversjon av vaksineanbefalingene

I Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell er det nylig publisert en tabell med kortversjon av gjeldende anbefalinger om koronavaksine i ulike grupper. Dette er en videreutvikling av et oppsett fra Grimstad kommune som FHI fikk fra statsforvalteren i Agder. Tabellen ligger øverst i [kapittelet om koronavaksine i vaksinasjonsveilederen](#)

7. Influensavaksinasjon - samvaksinerings med korona- og influensavaksine

Det er meldt om en økning i influensatilfeller i noen land i Europa, og det kan se ut til at enkelte land allerede er over utbruddsgrensen. For å redusere følgene av en kraftig epidemi i Norge senere i vinter er det viktig at de som har økt risiko for alvorlig influensasykdom vaksinerer seg. Dette gjelder særlig personer over 65 år, men også voksne, barn og unge med noen kroniske tilstander. Per 14.12 er dekningsgraden blant personer over 65 år på 63 %, noe som er langt unna målet om minst 75 % dekning. I enkelte deler av landet er dekningsgraden ned mot 50 %, og det er viktig å øke vaksineringsgraden.

I informasjonsbrev 36 ble det åpnet for at kommunene kunne gjøre en vurdering av samvaksinerings med korona- og influensavaksine for personer over 65 år, der de anså det som eneste mulighet for å få vaksinert med begge vaksiner før jul. Vurderingen gjaldt da personer over 65 år som ikke var å regne som skrøpelige. Samvaksinerings med adjuvantert influensavaksine var ikke anbefalt.

Dagens situasjon med en antatt stor smitteøkning som følge av omikron-varianten og begrensninger i testtilgang og -kapasitet, samt usikkerheter vedrørende influensasesongen og mulighet for kraftig influensautbrudd – **tilsier nå at det åpnes for samvaksinerings av personer i risikogrupperne også for øvrige aldersgrupper.**

Datagrunnlaget for samvaksinering med korona- og influensavaksine er ikke endret, men på grunn av økende smittepress av korona og behov for å vaksinere flest mulig i risikogruppene for alvorlig influensa åpner FHI for at man nå kan samvaksinere personer i risikogruppene i alle aldersgrupper.

Samvaksinering bør fremdeles unngås hos skrøpelige pasienter og dersom man skal vaksinere med adjuvantert influensavaksine (Fluad Tetra). På bakgrunn av de få studiene som er gjort er det ikke grunn til å tro at en slik praksis vil påvirke effekten av noen av vaksinene. Det er mulig at samvaksinering vil øke frekvensen av bivirkninger, men vurdert mot risikoen for alvorlig sykdom ved korona- eller influensainfeksjon for personer i risikogruppene, anses dette å ha mindre betydning.

Vennlig hilsen

Geir Bukholm
Smitteverndirektør

Are Stuwitz Berg
Avdelingsdirektør, avd. Smittevern og vaksine

Brevet er elektronisk godkjent
Kopi til: HOD og Hdir